

فصل هشتم:
تجزیه و تحلیل فوریه

MATLAB®

کلاس آموزشی

دکتر عدالت پناه دانشگاه آیندگان

فصل هشتم: تجزیه و تحلیل فوریه

۸-۱- تبدیل سریع فوریه

کاربرد: استخراج سیگنالی خاص از سیگنالی مرکب از چندیل سیگنال.

توابع پر کاربرد: `fft` , `ifft` , `fft2` , `ifft2`

>> `fx = fft(x)` تبدیل فوریه

>> `fx = fft(x,n)` تبدیل فوریه در n نقطه

>> `fsx = abs(fft(x))` طیف فوریه

>> `psx = (fft(x)).^2` طیف توان

>> `x = ifft(fx)` عکس تبدیل فوریه

>> `x = ifft(fx, n)` عکس تبدیل فوریه در n نقطه

فصل هشتم: تجزیه و تحلیل فوریه

۸-۲-مثالی از کاربرد تبدیل فوریه

ابتدا سیگنالی مرکب از دو سیگنال متناوب و راندوم (نویز) ایجاد می‌کنیم (واضح است که در شرایط واقعی این سیگنال از طریق آزمایش بدست می‌آید)


```
>> t= 0 : 1/99 : 1; بردار زمان
```

```
>> y= sin ( 2*15 * pi * t) + randn(size(t)); سیگنالی با  
فرکانس ۱۵ هرتز که با یک سیگنال نویز ترکیب شده است
```

فصل هشتم: تجزیه و تحلیل فوریه

۸-۲-مثالی از کاربرد تبدیل فوریه-ادامه

>> plot(t , y); رسم نمودار تغییرات سیگنال در حوزه زمان



فصل هشتم: تجزیه و تحلیل فوریه

۸-۲-مثالی از کاربرد تبدیل فوریه-ادامه

اکنون فرض می‌کنیم که سیگنال فوق را در اختیار داشتیم و می‌خواستیم بخش متناوب آنرا استخراج کنیم:

```
>> fy = abs ( fft(y) );
```

```
>> f = linspace(0 , 99 , length(y) );
```

در این رابطه ۹۹ فرکانس نمونه‌برداری است و در واقع ماکزیمم فرکانسی است که شدت آن در طیف فوریه وجود دارد.

f: بردار فرکانس است که بین ۰ تا ۹۹ تغییر می‌کند

فصل هشتم: تجزیه و تحلیل فوریه

۸-۲-مثالی از کاربرد تبدیل فوریه-ادامه

```
>>plot(f , fy)
```

نمودار طیف فوریه:

